



# 安邦集团

## 除草剂系列之

## 草甘膦异丙胺盐 Phosphonomethyl



# 新一代 配方的草甘膦 全面铲除杂草

### 产品基本介绍

### Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
草甘膦异丙胺盐	每升制剂含草甘膦异丙胺盐410克	水剂	PD20080728

### 产品特性

### Product Characteristics

本品为内吸传导型灭生性除草剂。主要通过抑制植物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。本品用于防治柑橘园杂草。通过杂草绿色部分吸收，将其连根杀死。对种子及作物根系无不良影响，不影响下茬作物喷洒药液后，4天杂草叶片即开始枯黄，继而变褐，7—10天后，杂草地部分开始腐烂，最后枯死。

## 品牌定位 Brand positioning

- 近年销量最大除草剂，用量逐年上升，建设安邦品牌除草剂。

## 关键技术信息 Technology Information

- 毒性低-大白鼠急性经口LD<sub>50</sub>>5000mg/kg，对鸟类、鱼类及水生生物低毒，对蜜蜂无害，对环境无污染，收获时稻米中无残留物检出。
- 杀草谱广-对稻田多种顽固性阔叶杂草及莎草有特效。
- 施药时间灵活-播后或插秧后3-15天均可使用，兼有芽前、芽后作用。
- 持效期长-施药一次，足够一个生长季节控草。
- 安全性高-对水稻及下茬作物极为安全。

## 针对作物 The Crops



## 使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
柑橘园	杂草	200-400克/亩	兑水30公斤（2桶水）均匀喷雾
桑园			
茶园			
橡胶园			
森林防火隔离带、铁路、公路			

## 使用说明 Instructions for use

- 41%的200-400克/亩兑水30公斤（2桶水）均匀喷雾。对于多年生的恶性杂草，如白茅，在第一次施药一个月后再施一次药，才能达到理想的效果，或者直接加大一倍的使用量，也能达到很好的效果，但通过加大使用量除草，对土壤会有一定的伤害。
- 注意事项:1、不能用硬水或泥浆水配药，否则会降低药效。2、低温贮存时会有结晶析出，使用前充分摇动容器，待结晶溶解后再用，以保证药效。3、施药时穿长衣长裤、戴手套、眼镜、戴口罩等；此时不能吸烟、饮水等；施药后清洗干净手脸等。4、清洗器具的废水不能排入河流、池塘等水源，废弃物要妥善处理，不能随意丢弃，也不能做他用。5.本品对金属制成的镀锌容器有腐化作用，易引起火灾。6、孕妇及哺乳期的妇女禁止接触。7、施药后5天内不能割草、翻耕、放牧等。



## 关键卖点 The key selling point

- 广泛用于柑橘园、桑园、茶园、橡胶园、森林防火隔离带、铁路、公路、草坪更新等非耕地除草和作物免耕除草以及抗草甘膦转基因作物除草。