



安邦集团

除草剂系列之

草甘膦异丙胺盐 Phosphonomethyl



产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
草甘膦异丙胺盐	每升制剂含草甘膦异丙胺盐620克	水剂	PD20080728

产品特性

Product Characteristics

本品为内吸传导型灭生性除草剂，具有含量高，活性高，溶解性能好的特点。通过杂草绿色部分吸收，将其连根杀死。对种子及作物根系无不良影响，不影响下茬作物喷洒药液后，4天杂草叶片即开始枯黄，继而变褐，7—10天后，杂草地下部分开始腐烂，最后枯死。

品牌定位 Brand positioning

- 近年销量最大除草剂，用量逐年上升，建设安邦品牌除草剂。

关键技术信息 Technology Information

- 毒性低-大白鼠急性经口LD50 > 5000mg/kg，对鸟类、鱼类及水生生物低毒，对蜜蜂无害，对环境无污染，收获时稻米中无残留物检出。
- 杀草谱广-对稻田多种顽固性阔叶杂草及莎草有特效。
- 施药时间灵活-播后或插秧后3-15天均可使用，兼有芽前、芽后作用。
- 持效期长-施药一次，足够一个生长季节控草。
- 安全性高-对水稻及下茬作物极为安全。
 - 1.本品于杂草转入旺盛生长期时用药。
 - 2.草甘膦与土壤接触立即失去活性，宜作茎叶处理。
 - 3.温暖晴天用药效果优于低温天气。喷药后6~8小时内降雨会降低药效，必须重喷。
 - 4.防除多年生杂草用量取上限，一次药量分两次、间隔5天施用，能提高除草效果。

使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
柑柑橘园	杂草	120-240克/亩	兑水30公斤（2桶水）均匀喷雾
桑园			
茶园			
橡胶园			
森林防火隔离带、铁路、公路			

使用说明 Instructions for use

- 62%120-240克/亩兑水30公斤（2桶水）均匀喷雾。对于多年生的恶性杂草，如白茅，在第一次施药一个月后再施一次药，才能达到理想的效果，或者直接加大一倍的使用量，也能达到很好的效果，但通过加大使用量除草，对土壤会有一些的伤害。
- 注意事项:1.施药时应防止药液飘移到作物茎叶上，以免产生药害。作物行间除草可用加罩喷头定向喷雾。2.不能用硬水或泥浆水配药，否则会降低药效。3.低温贮存时会有结晶析出，使用前充分摇动容器，待结晶溶解后再用，以保证药效。4.使用本品时应戴防护手套、口罩，穿干净防护服，不能吃东西、喝水和抽烟。使用后应用肥皂和清水洗净裸露的皮肤和衣服。避免与皮肤、眼睛直接接触，防止由口鼻吸入。5.施药后应及时清洗药械。切不可将废液、清洗液倒入河塘等水源。6.孕妇和哺乳期妇女禁止接触此药。7.本品对金属制成的镀锌容器有腐化作用，易引起火灾。8.施药后3天禁止放牧、割草和翻耕。9.用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

关键卖点 The key selling point

- 广泛用于柑橘园、桑园、茶园、橡胶园、森林防火隔离带、铁路、公路、草坪更新等非耕地除草和作物免耕除草以及抗草甘膦转基因作物除草。

