



安邦集团

杀菌剂系列之

三唑酮 Ketotriazole



小麦白粉病 锈病的克星

产品基本介绍 Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
三唑酮	15%	可湿性粉剂	PD20040130

产品特性 Product Characteristics

本品是一种具有内吸性的三唑类杀菌剂，具有预防、铲除、治疗作用。被植物的各部分吸收后，能在植物体内传导。其杀菌机理主要是抑制菌体麦角甾醇的生物合成，因而抑制或干扰菌体附着孢及吸器的发育，菌丝的生长和孢子的形成。可用于小麦白粉病的防治。

品牌定位 Brand positioning

- 小麦白粉病具有良好的防治作用，在近年北方麦区的统防统治方面做出了突出贡献。

关键技术信息 Technology Information

- 优良的内吸活性。
- 既有保护作用，又有治疗作用和铲除作用。
- 抑菌谱广-对白粉病、锈病和黑穗病等有特效。
- 应用范围广-可用于防治麦类、瓜类、苹果、辣椒、烟草、葡萄等的白粉病，麦类、豆类、花生、桑的锈病，梨、苹果的赤星病，大麦、小麦、燕麦、黑麦的散黑穗病，大麦坚黑穗病等。也能防治小麦叶枯病、雪腐病，大麦云纹病等。

针对作物 The Crops



使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
小麦	白粉病、锈病	60—80克/亩	兑水50公斤喷雾

使用说明 Instructions for use

- 本品对小麦白粉病具有良好的防治作用，每亩用商品量40—45克稀释成2000倍液，于病害始发期均匀喷雾1—2次。
- 本品可与杀菌剂代森锌、对甲基抑菌灵和杀虫剂敌百虫、氧化乐果等农药混用，混用应做到现配现用，所配药剂无论是单剂或混剂都需一次用完。
- 本剂虽然毒性很低，但在使用时仍需注意安全，谨防药液吸入，操作完毕后，用肥皂和水清洗手和脸部，以防污染皮肤。
- 本剂用后密封，存放在干燥阴凉处，切勿与粮食、饲料、食品一起存放。本剂易燃，应远离火源。
- 1.施药时期：于病害初发期施用。2.要按规定用药量使用，否则作物易受药害。3.大风天或预计一小时内降雨，请勿施药。

关键卖点 The key selling point

- 本品为防治小麦后期病害最光谱高效药剂，产品知名度高。

