



安邦集团

杀虫剂系列之

敌敌畏 Dichlorvos



敌敌畏来帮忙 害虫全死亡

产品基本介绍

Product Introduction

通用名	有效成分含量	剂型	农药登记号
敌敌畏	77.5%	乳油	PD85105-49

产品特性

Product Characteristics

本品为胆碱酯酶抑制剂，对害虫有触杀、胃毒和薰蒸作用。施药后易分解。可用于茶树食叶害虫、棉花蚜虫和造桥虫、苹果小卷叶蛾和蚜虫、青菜菜青虫、桑树尺蠖、小麦黏虫和蚜虫、粮仓及卫生害虫的防治。

关键技术信息 Technology Information

- 施药时期：于虫害发生时施用。
- 本品用于室内时必须注意安全。
- 大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

针对作物 The Crops



关键卖点 The key selling point

- 杀虫谱广：对咀嚼式、刺吸式和舐吸式口器害虫均有效。
- 适用作物多：可用于防治粮、棉、茶、桑、烟草、蔬菜、果树等多种作物上的农业害虫，另外还可用于防治仓库和卫生害虫。
- 敌敌畏蒸气压较高，对害虫有极强的击倒力。
- 施药后易分解，持效期短，无残留。

使用范围和方法 Application and method

作物（范围）	防治对象	制剂用药量	使用方法
棉花	蚜虫、造桥虫	51.6—103.2克/亩	喷雾
小麦	黏虫、蚜虫	51.6克/亩	喷雾
茶树	食叶害虫	51.6克/亩	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	400—500倍液；0.5—0.65克/立方米	喷雾；挂条熏蒸
青菜	菜青虫	51.6克/亩	喷雾
桑树	尺蠖	51.6克/亩	喷雾
卫生	多种卫生害虫	300—400倍液；0.1克/立方米	泼洒；挂条熏蒸
苹果树	蚜虫、小卷夜蛾	1600—2000倍液	喷雾

使用说明 Instructions for use

- 1、本品在温室栽培作物上使用的安全间隔期为3天，其它栽培方式的安全间隔期为7天。
- 2、该产品用于粮仓喷雾和熏蒸时，仅用作空仓器材杀虫剂，不可用作他用。
- 3、对高粱、月季花易产生药害，对玉米、豆类、瓜类幼苗及柳树也较敏感。使用时应注意避免药液飘移到上述作物上。
- 4、本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。
- 5、使用本品时应穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。
- 6、本品对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒，施药期间应避免对周围蜂群的影响、蜜源作物花期、蚕室和桑园附近禁用。远离水产养殖区施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
- 7、建议与其他作用机制不同的杀虫剂轮换使用，以延缓抗性产生。
- 8、用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。
- 9、孕妇或哺乳期妇女禁止接触本品。

