



安邦集团

杀虫剂系列之

杀虫双
Dimehypo



安邦杀虫双
值得信赖的品牌

产品基本介绍

Product Introduction

| 通用名 | 有效成分含量 | 剂型 | 农药登记号 |
|-----|--------|----|------------|
| 杀虫双 | 18% | 水剂 | PD84104-52 |

产品特性

Product Characteristics

本品为沙蚕毒素类杀虫剂，对害虫有触杀和胃毒作用，并兼有一定的熏蒸作用。可用于水稻、蔬菜、果树、玉米、小麦、甘蔗上多种害虫的防治。

品牌定位 Brand positioning

- 是目前国内生产量及用量最大的农药品种之一。

关键技术信息 Technology Information

- 本品在用于防治水稻螟虫时，施药时就确保田间有3~5cm水层3~5天，以提高防治效果，切忌干田用药，以免影响药效。
- 本品对豆类、棉花、及白菜、甘蓝等十字花科蔬菜较为敏感，尤以夏天易产生药害，施药时应避免药液漂移到上述作物上。

针对作物 The Crops



使用范围和方法 Application and method

| 作物（范围） | 防治对象 | 制剂用药量 | 使用方法 |
|--------|------|------------|------|
| 水稻 | 多种害虫 | 200—250克/亩 | 茎叶喷雾 |
| 甘蔗 | 多种害虫 | 200—250克/亩 | 茎叶喷雾 |
| 果树 | 多种害虫 | 500—800倍液 | 茎叶喷雾 |
| 小麦 | 多种害虫 | 200—250克/亩 | 茎叶喷雾 |
| 玉米 | 多种害虫 | 200—250克/亩 | 茎叶喷雾 |
| 蔬菜 | 多种害虫 | 35—50克/亩 | 茎叶喷雾 |

使用说明 Instructions for use

1. 本品在水稻、蔬菜、果树、玉米、甘蔗、小麦作物上的安全间隔期为15天，每个作物周期的最多使用次数为3次。
2. 本品对家蚕的毒性较高，在蚕区使用时必须十分谨慎，禁止污染桑叶和蚕宝。对鱼等水生生物有毒，应远离水产养殖区施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
3. 施药人员应避免和药剂直接接触，不要迎风喷雾，以免吸入药雾。操作本品时不饮食、不抽烟。不要让无关人员及动物进入刚施药区。
4. 本品可通过皮肤渗入。使用本品时，应戴防护手套、防毒面具，穿干净防护服，避免与眼睛、皮肤直接接触，防止口、鼻吸入。施药后应及时用肥皂和清水清洗裸露的皮肤和衣服。
5. 施药后应彻底清洗药械，残液及清洗液勿倒入河塘等水源。
6. 用过的容器应妥善处理，不可作他用，也不可随意丢弃。

关键卖点 The key selling point

- 杀虫谱广：对水稻、小麦、果树、蔬菜等多种作物的主要害虫均有良好的防效。
- 作用方式多样：具有强烈的触杀、胃毒和内吸作用，还兼有一定的熏蒸和杀卵作用。
- 杀虫效果好，成本低。

